

受 理 日 : 2017-11-10

診 療 科 : 外科

医 師 名 : 堀川 雅人

レジメン名称 : weeklyPTX 3週毎ハーセプチン

疾 患 名 : 乳癌

処方内容

注 射	順	薬品名・用量	投与方法	投与時間	備考
	1	生食100mL + デキサート3.3mg2A + ゾフラン4mg1A + ガスター20mg1A	div	15分	初回 day1
	2	生食100mL + デキサート3.3mg1A + ゾフラン4mg1A + ガスター20mg1A	div	15分	初回day8.15、2回目day1.8.15
	3	生食250ml ハーセプチン8mg/kg	div	90分	初回 day1
	4	生食250ml ハーセプチン6mg/kg	div	30分	2回目以降 day1
	5	5%ブドウ糖液250ml パクリタキセル80 ~ 100mg/m ²	div	60分	day1.8.15
	6	生食100ml	div	ルートキープ フラッシュ用	
	注意	21日間隔			

内 外 用	順	薬品名・用量	用法	備考
	1	レスタミンコーワ錠10mg	点滴30分前服用	
	2	カイトリル錠1mg	2T 分1朝食後2日分	点滴翌日から
	3	セファランチン錠1mg	6T 分3毎食後21日分	点滴翌日昼食後から
	4	ロキソニン60mg	1T 屯用 5回分	初回のみ
	注意			