

受 理 日 : 2017-10-30  
 診 療 科 : 泌尿器科  
 医 師 名 : 岸野 辰樹  
 レジメン名称 : GC療法  
 疾 患 名 : 尿路上皮癌

処方内容

| 注 射 | 順  | 薬品名・用量   | 投与方法 | 投与時間  | 備考              |
|-----|----|--|------|-------|-----------------|
|     | 1  | 生食100mL + デキサート3.3mg2管   | div  | 30分   | (A)1日目、8日目、15日目 |
|     | 2  | 生食100mL + ゲムシタピン(1000mg/m2)  | div  | 30分   | (A)1日目、8日目、15日目 |
|     | 3  | ポタコールR500mL  | div  | 2時間   | (B)2日目          |
|     | 4  | の側管 : 生食100mL + アロキシ0.75mg + デキサート3.3mg3管  | 側注   | 30分   | (B)2日目          |
|     | 5  | 生食1000mL + ランダ(70mg/m2)  | div  | 3時間   | (B)2日目          |
|     | 6  | 生食500mL  | div  | 1.5時間 | (B)2日目          |
|     | 7  | の側管20% マンニトール300mL   | 側注   | 2時間   | (B)2日目          |
|     | 注意 | ( 続き ) 8. ポタコールR500mL div 2時間(B)2日目 9. ポタコールR500mL div 2時間 (B)2日目 10. ポタコールR500mL div 2時間 (B)2日目 |      |       |                 |

| 内 外 用 | 順  | 薬品名・用量  | 用法  | 備考       |
|-------|----|---------|---|----------|
|       | 1  | イメンドセット | ランダ当日点滴30分前に125mg1C、ランダ翌日から2日間<br>80mg朝食後1C | day2 ~ 4 |
|       | 注意 |         |   |          |