



はこうそうしょうがいらい 跛行創傷外来



□ 間歇性跛行

歩行により下肢痛が生じ、休息すれば症状が消失する一連の症状

□ 包括的高度慢性下肢虚血

(chronic limb-threatening ischemia: CLTI)

安静時痛や下肢潰瘍、壊死が少なくとも2週間以上改善せず持続するもの

毎週火曜日
午後

担当医

井上 創輝 医師
循環器内科

- ・日本内科学会 認定内科医
- ・日本循環器学会 循環器専門医
- ・日本心血管インターベンション治療学会 認定医
- ・日本不整脈心電学会 不整脈専門医
- ・日本医師会 健康スポーツ医
- ・日本心臓リハビリテーション学会
- ・Japan Endovascular Treatment Conference

- ▶ ABI検査
- ▶ 皮膚灌流圧測定 (SPP)
- ▶ 下肢動脈エコー検査
- ▶ 造影CT
- ▶ 血管造影検査

ABI=

閉塞性動脈硬化症 疑い

~ 0.90

足首の最高血圧

境界型

上腕の最高血圧

0.91 ~ 0.99

mmHg

正常




1.00 ~ 1.40

Case Report

EVT ENDOVASCULAR THERAPY

- # 間歇性跛行 (Rutherford分類 2)
- # 透析 (10年以上)

右足 ABI=0.50



長期透析患者ということもあり高度石灰化を伴う慢性閉塞している病変であった。石灰化により難渋したものの病変部をガイドワイヤが通過、ハイプレッシャーバルーンにて病変部に高圧をかけて拡張。薬剤溶出バルーンにて病変部に薬剤塗布し、ステントを留置することなく終了。